

Genac® 5 %

Collyre



COMPOSITION :

- N-Acétylcystéine	5,000 g
- Chlorure de benzalkonium	0,010 g
- Excipients : qsp	100 ml

Médicament autorisé n° 336 478.3

CLASSE THÉRAPEUTIQUE :

Cicatrisant oculaire.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

- Ce médicament est un collyre.
- Ce médicament est préconisé pour favoriser la cicatrisation des ulcérations cornéennes d'origine traumatique.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

- Si les symptômes (rougeur, douleur, gêne, etc...) persistent après une semaine de traitement, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.
- Lentilles de contact : Compte tenu de la composition du collyre (chlorure de benzalkonium) et de l'affection traitée (traumatisme oculaire), le port de lentilles de contact est à proscrire durant toute la durée de ce traitement.

DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

AUTRES EFFETS DU MÉDICAMENT :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS ; NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.


POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

- La posologie usuelle est de 1 goutte, 4 à 5 fois par 24 heures dans l'œil ou les yeux atteint(s), pendant 8 jours.
- Le traitement ne doit pas être poursuivi au delà de 8 jours sans un nouvel avis médical.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE D'EMPLOI :

- Prendre le flacon, soulever (voir schéma) et enlever la rondelle plastique jaune dans le point indiqué ainsi que la bague aluminium attenante.
- Ouvrir la pochette plastique, prendre l'embout.
- Enfoncer l'embout compte-gouttes sur le flacon verre.
- Retirer le capuchon en plastique.
- Instiller 1 goutte dans l'œil ou les yeux à traiter en appuyant légèrement sur l'embout plastique
- Remettre le capuchon.



CONDITIONS DE DÉLIVRANCE :

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS,
- NE PAS RÉUTILISER SANS AVIS MÉDICAL,
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

DURÉE DE STABILITÉ :

- NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUÉE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

- Après ouverture du flacon : 15 jours.

(11/95)



Laboratoires GENEVRIER S.A.

B.P. 47

F - 06901 Sophia Antipolis Cedex